

ÚLCERA GÁSTRICA EM EQUINO – RELATO DE CASO

¹ José Ernanes de Castro Moura Junior, ²Israel Lima Viana, ³Ana Karine Rocha de Melo Leite. ⁴Lais Sisnando Lopes.

¹Discente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Terra Nordeste – FATENE, Caucaia, Ceará, Brasil. E-mail:

ernanejr@live.com ²Discente do curso de Medicina Veterinária da Faculdade Cisne, Quixadá, Ceará, Brasil, ³Docente do curso de Medicina Veterinária da Universidade de Fortaleza (UNIFOR), Fortaleza, Ceará, Brasil, ⁴Discente do curso de Medicina Veterinária no Centro Universitário Fametro, Fortaleza, Ceara, Brasil.

INTRODUÇÃO

As úlceras gástricas são uma desordem prevalente em potros e equinos adultos, comprometendo a performance desses animais, fomentando impacto econômico relevante com o alto custo de tratamento e com etiologia não bem elucidada.

As péssimas condições de estalagem, estresse, intenso ritmo de treinamento, uso indiscriminado de anti-inflamatórios e não esteroidais (AINEs), são alguns fatores que predispõem os equinos à ocorrência de úlceras gástricas.

OBJETIVO

- Diante disso, objetiva-se relatar um estudo de caso de úlcera gástrica.

RELATO DE CASO

Hospital veterinário metropolitano-Caucaia-CE

Equino fêmea

9 anos

440kg

Apresentando dor abdominal intensa

Histórico de cólicas recorrentes

Sinais clínico:

TPC 2, taquicardia, taquipneia, motilidade reduzida, mucosa oral hiperêmica com halo endotoxêmico, animal aerofágico

Resultados e discussão

Iniciou-se o atendimento com sondagem nasogástrica obtendo oito litros de refluxo estomacal espontâneo de aspecto sanguinolento (figura 1). Realizou-se lavagem gástrica com água para auxiliar na remoção do conteúdo estomacal e instituído fluidoterapia intravenosa com ringer lactato, totalizando 14 litros por via intravenosa e ranitidina 1mg/kg via intravenosa, porém o paciente evoluiu para o óbito. Constatou-se na necropsia extensa área de necrose e ruptura da mucosa gástrica (figura 2). A cavidade peritoneal estava contaminada com o conteúdo alimentar.

conclusão

- As úlceras gástricas são de grande relevância na clínica veterinária, tendo uma maior incidência quando os animais passam mais tempo ociosos nas baias, como na pandemia do COVID-19, em decorrência do cancelamento de seus treinos e competições, associado ao uso indiscriminado de AINEs, aerofagia e ao tardio diagnóstico, torna o prognóstico reservado.



Figura: 1.



Figura: 2.

Fonte: Autores

PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO